

Checkliste: Indikationsstellung zur Therapie der Vitiligo bei Personen ab 12 J. mit topischen oder systemischen Innovationen

Gemäß der gültigen AWMF-Leitlinie zur Vitiligo besteht bei **klinisch relevanter Vitiligo** die Indikation für eine Arzneimitteltherapie und/oder Phototherapie. Für die Einleitung oder Fortführung dieser Therapie mit topischen oder systemischen Innovationen sind beim Patienten die folgenden Kriterien zu prüfen:

1. Allgemeine Voraussetzungen für die Therapie			Ja
1	Alter	≥ 12 Jahre	O
2	Diagnose	Klinisch gesicherte nicht-segmentale Vitiligo	O

2. Klinische Eignungskriterien für die Therapie der Vitiligo mit Innovationen			Ja
A	Relevanter objektiver Schweregrad	<p>Liegt vor, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien bei Baseline (vor erster Therapie) gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Globaler Schweregrad (PGA) mind. 3 auf einer 5-teiligen Skala <u>oder</u> • Gesicht: F-VASI* >0,5 / Befallene Körperoberfläche (BSA) von ≥0,5% <u>oder</u> • Körper: T-VASI* >3 / Befallene Körperoberfläche (BSA) von ≥3% <u>oder</u> <p>Generelle Upgrade-Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Befall sichtbarer Areale (Hände, Gesicht, Hals) • Befall der Genitale 	O O O O O O
B	Relevante subjektive Belastung	<p>Liegt vor, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien der <u>krankheitsbezogenen</u> Belastung gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLQI >10 oder cDLQI >10 (von 30) <u>oder</u> • VitiQoL >45 (von 90) <u>oder</u> • EQ-5D <75 (von 100) <u>oder</u> • WHO-5 <13 (von 25) <u>oder</u> • Relevante, krankheitsbedingte psychosoziale Beeinträchtigung, gemessen mit einem anderen standardisierten Meßverfahren: 	O O O O O O
C	Fehlendes Therapie-Ansprechen	<p>Andere Maßnahmen (topische Glukokortikosteroide (TCS) <u>oder</u> topische Calcineurininhibitoren (off-label) <u>oder</u> Phototherapie) kommen nicht in Frage, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein hinreichendes Ansprechen / Kontraindikation einer Phototherapie und einer Lokalthherapie (TCS, TCI) <u>oder</u> • Keine Aussicht auf Erfolg mit TCS, TCI und Phototherapie 	O O O

3. Schlußfolgerungen			
D	<p>➔ Die Indikation für die Therapie ist gegeben, da <u>jeweils mind. ein</u> Kriterium aus A, B und C zutrifft:</p>		O Ja
E	<p>➔ Folgende zugelassene Therapeutika sind wegen bereits aufgetretener Nebenwirkungen, Kontraindikationen oder fehlender Nutzenerwartung <u>nicht</u> indiziert:</p> <p>_____</p>		
F	<p>➔ Therapieeinleitung mit: _____</p>		
G	<p>➔ Optional: Einverständnis des Patienten (Eltern) nach Aufklärung liegt vor:</p> <p>_____</p> <p>(Ggf. Datum, Unterschrift)</p>		O Ja

*F-VASI = Facial Vitiligo Area Scoring Index (F-VASI) ; T-VASI = Total body Vitiligo Area Scoring Index (T-VASI)