

Checkliste: Indikationsstellung zur Systemtherapie der Psoriasis

Gemäß der gültigen AWMF-Leitlinie zur Psoriasis (Schuppenflechte) besteht bei **mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis** (Psoriasis vulgaris, ICD-10 L40.0 und L40.70) die Indikation für eine Systemtherapie. Für die Einleitung oder Umstellung der Systemtherapie sind beim Patienten die folgenden Kriterien zu prüfen:

1. Allgemeine Voraussetzungen für die Systemtherapie			Ja
1	Alter	≥ 4 Jahre (Zulassungsstatus beachten)	<input type="radio"/>
2	Diagnose	Klinisch gesicherte Psoriasis vulgaris (L40.0G)	<input type="radio"/>

2. Klinische Eignungskriterien für eine Systemtherapie			Ja
A	Relevanter objektiver Schweregrad	<p>Liegt vor, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PASI > 10 (L40.70G) <u>oder</u> • BSA > 10 <u>oder</u> • Globaler Schweregrad (PGA) mind. 3 auf einer 5-teiligen Skala <u>oder</u> • Upgrade-Kriterien: <ul style="list-style-type: none"> - Ausgeprägte Erkrankung an sichtbaren Arealen oder Kopfhaut <u>oder</u> - Erkrankung des Genitalbereichs <u>oder</u> der Hand- und/oder Fußflächen <u>oder</u> - Onycholysis oder Onychodystrophie ≥ 2 Fingernägel <u>oder</u> - Therapierefraktäre Plaques <u>oder</u> • Therapierelevante Psoriasis-Arthritis 	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
B	Relevante subjektive Belastung	<p>Liegt vor, wenn <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLQI > 10 <u>oder</u> • Pruritus > 6 (auf VAS/NRS von 0-10), der zum Kratzen führt • Relevante subjektive Belastung, gemessen mit einem anderen validierten Verfahren: _____ 	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
C ₁	Check First-line-Therapien: Konventionell vs. biologisch	<p>Konventionelle Systemtherapien* lassen keinen hinreichenden Therapieerfolg erwarten, wenn <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PASI ≥ 20 <u>oder</u> • DLQI ≥ 15 <u>oder</u> • Kein zu erwartendes Ansprechen (Ziel: z. B. PASI90 oder aPASI < 2) <u>oder</u> • Konventionelle Systemtherapie bereits erfolgt, dabei kein Ansprechen oder Wirkverlust oder Nebenwirkungen <u>oder</u> • Kontraindikation/en 	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
C ₂	<u>oder:</u> Check Second-line-Therapien	<p>Patient hat bereits mindestens eine systemische First-line-Therapie erhalten <u>oder</u> es besteht eine Kontraindikation gegen diese:</p>	<input type="radio"/>

*Methotrexat, Fumarsäureester, Ciclosporin, Acitretin aPASI=absoluter PASI

3. Schlußfolgerungen		Ja
D	→ Die Indikation für eine Systemtherapie ist gegeben, da <u>jeweils mindestens ein Kriterium aus A und B</u> zutrifft:	<input type="radio"/>
E	→ Die Indikation für eine First-line- Biologika-Systemtherapie ist gegeben, da ein Kriterium aus C ₁ zutrifft: → Die Indikation für eine Second-line- Systemtherapie ist gegeben, da das Kriterium C ₂ zutrifft:	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
F	→ Therapie erfolgt daher mit: _____	